

# foliQ®

## BÓR

# LISTOVÉ HNOJIVO TEKUTÉ











FoliQ® BÓR je snadno použitelné a snadno dávkovatelné kapalné hnojivo s obsahem bóru pro použití u plodin s vysokými nároky na obsah bóru (např. cukrová řepa, řepka olejka, košťalová zelenina, mrkev, celer, ovocné plodiny). Vysoký obsah bóru ve snadno vstřebatelném složení usnadňuje včasně a spolehlivě potlačení latentního i zjevného nedostatku bóru.

V doporučených dávkách je přípravek FoliQ® BÓR rostlinami velmi dobře tolerován.

### PŘÍPRAVA PRACOVNÍHO ROZTOKU

FoliQ® BÓR lze míchat s většinou přípravků na ochranu rostlin. Před použitím protřepejte! Před první aplikací směsi v nádrži proveďte test mísení v malém množství vody. Příprava aplikační kapaliny: 1) Naplňte nádrž postřikovače vodou do 50–70 % jejího objemu a zapněte míchací zařízení. 2) Přidejte přípravky na úpravu vody. 3) Přidejte listová hnojiva – FoliQ® BÓR. 4) Přidejte přípravky na ochranu rostlin v pořadí doporučeném výrobcem. 5) Přidejte adjuvanty, např. Silgo 48. 6) Za stálého míchání doplňte nádrž vodou na stanovený objem. 7) Po aplikaci umyjte postřikovač podle pokynů výrobce přípravku na ochranu rostlin pomocí specializovaných přípravků, například Spramac.

## DÁVKY A OBDOBÍ APLIKACE:

OVOCNÁŘSTVÍ			ZEMĚDĚLSTVÍ						
									
JÁDROVITÉ OVOCE	PECKOVITÉ OVOCE	JAHOODY	ŘEPKA OLEJKA	CUKROVÁ ŘEPA	KUKURICE	BRAMBORY	KOŠTÁLOVÁ ZELENINA	MRKEV/CELER	OBILOVINY MÁK
<b>1-2 l/ha</b>	<b>1-2 l/ha</b>	<b>2 l/ha</b>	2 aplikace <b>1 l/ha</b>	2 aplikace <b>1 l/ha</b>	1-2 aplikace <b>1 l/ha</b>	1-2 aplikace <b>1 l/ha</b>	2 aplikace <b>1 l/ha</b>	2 aplikace <b>1 l/ha</b>	1-2 aplikace <b>1 l/ha</b>
3 aplikace: 1) ve fázi zeleného pupenu; 2) ve fázi opadu okvětních lístků; 3) po sklizni	3 aplikace: 1) ve fázi zeleného pupenu; 2) ve fázi opadu okvětních lístků; 3) po sklizni	1 aplikace: bezprostředně před květem	Latentní nedostatek = průměrná potřeba	2-3 aplikace <b>1,5 l/ha</b>	2-3 aplikace <b>1,5 l/ha</b>	2 aplikace <b>1,5 l/ha</b>	2 aplikace <b>1,5 l/ha</b>	2-3 aplikace <b>1,5 l/ha</b>	2-3 aplikace <b>1,5 l/ha</b>
			Zjevný nedostatek = vysoká potřeba	2 aplikace <b>1,5 l/ha</b>	2 aplikace <b>1,5 l/ha</b>	2 aplikace <b>1,5 l/ha</b>	2 aplikace <b>1,5 l/ha</b>	2 aplikace <b>1,5 l/ha</b>	2 aplikace <b>1,5 l/ha</b>

fáze intenzivního růstu

Chcete-li získat podrobnější pokyny, kontaktujte společnost AGRII nebo místního dodavatele. K použití pouze v odůvodněných případech. Nepřekračujte doporučený počet aplikací.

**Agrii**™

OBJEM: 20 L  
ČISTÁ HMOTNOST 26,80 kg

**PFC 1(C)(I)(b)(i) Jednoduché  
tekuté anorganické makroživinové  
hnojivo N (5) se stopovým prvkem  
bór B (+11) ve formě  
boroethanolaminu  
HNOJIVÝ VÝROBEK EU**

**foliQ<sup>®</sup>**  
**BÓR**

**SLOŽENÍ:**

boroethanolamin (CAS: 26038-87-9)¹;

¹CMC 1: Základní složky a směsi

**Deklarovaný obsah živin (m/m):**

Celkový dusík (N) - 67 g/l, dusík amonný (N) (NO<sub>3</sub>) - 67 g/l, Celkový obsah boru (B) - 147 g/l

**ZPŮSOB APLIKACE**

FoliQ<sup>®</sup> BÓR lze aplikovat pomocí všech typů postřikovačů; doporučené množství vody: 200–1000 l/ha. Účinnost listového hnojiva zlepšíte aplikací večer, ráno nebo za zamařených dnů. Při aplikaci ve formě kapaliny do substrátu lze FoliQ<sup>®</sup> BÓR aplikovat ze všech typů zavlažovacích systémů, včetně kapkové závlahy.

**SKLADOVÁNÍ**

Skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od +8°C do +30°C (zabraňte rychlým změnám teplot). Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, vysokou teplotou a přímým slunečním zářením. Obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy.

**PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ**

Chraňte oči a pokožku. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranný oděv – kombinézu, ochranné rukavice a gumové rukavice. V případě nevolnosti vyhledejte lékařské ošetření, informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci.

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Chraňte před vyschnutím, rozlitím a teplotami nad 30 °C.

**MANIPULACE S ROZLITÝM MATERIÁLEM**

Pokud je to možné, rozlitou kapalinu shromážděte a přelijte zpět do nádob. Pokud je to možné, použijte ji znovu. Místo rozlité důkladně opláchněte velkým množstvím vody. Zabraňte odtoku do kanalizace. Rozlité zbytky lze také posypat anorganickými, inertními absorbenty, např. diatomitickou zemínou. Nepoužívejte piliny. Veškerý odpad a zbytky, které nebudou použity, uložte k pozdější likvidaci.

**POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ**

Výrobek není samozápalný ani výbušný. Výrobek se rozkládá a produkuje jedovaté plyny až po vyschnutí a přehřátí rozsypaného hnojiva (například v případě požáru). V takovém případě je nutné při vstupu do skladu používat vhodnou plynovou masku. Požár se hasí pouze vodou. Okamžitě informujte hasiče.

Používejte pouze při nedostatku bóru. Nikdy nepřekračujte doporučenou dávku.

SLOŽENÍ	
Makro nutrienty	hmotnostních %
Celkový dusík (N)	5,00
Amonný dusík (N)	5,00
Mikroživiny	
Bór (B) <sup>^</sup> (ve formě bproethanolamin)	11,00
<sup>^</sup> zcela rozpustné ve vodě	

Hustota – 1,34 kg/l; pH 7,0–8,0.

**! Používejte pouze při nedostatku bóru. Nikdy nepřekračujte doporučenou dávku.**

**OPATŘENÍ**

**P102** Uchovávejte mimo dosah dětí.

**P264** Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.

**P280** Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

UFI: C800-F0QG-S00P-TMC3

**OBJEM: 20 L**  
**ČISTÁ HMOTNOST: 26,80 kg**

Agrii Polska Sp. z o.o.  
ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań, Polsko;  
telefon: (0 61) 842 94 66, fax: (0 61) 842 94 67  
www.agrii.pl



Pouze pro profesionální uživatele.  
**Datum výroby a číslo šarže: viz obal**  
**Doba použitelnosti – 3 roky od data výroby**  
**uvedeného na obalu.**